

**USO AGRÍCOLA**  
**FMC**  
**FENTROL**  
**gamma cyhalotrina**  
Insecticida / Cápsulas en suspensión

<b>Composición Porcentual</b>	<b>% en Peso</b>
<b>Ingrediente Activo:</b>	
<b>gamma cyhalotrina:</b> (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 59.826 g/L a 20°C)	5.90 %
<b>Ingredientes Inertes:</b> Antimicrobial, Agentes de viscosidad, Solventes, Pared de la microcápsula, Surfactante, Agente de dispersión y Buffer.	<u>94.10 %</u>
TOTAL	100.00 %

Registro único: RSCO-INAC-0103L-303-394-006

Contenido neto:



**Nocivo si se inhala**

Número de lote:  
Fecha de fabricación (año/mes/día):  
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fabricación

**Titular del registro, importador y distribuidor:**  
**FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.**  
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,  
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco  
Tel: 01 800 FMC AGRO (362 2476)  
contactomexico@fmc.com

**HECHO EN DINAMARCA**  
**ENVASADO EN MÉXICO**



**PRECAUCIÓN (azul 293-C)**

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS**  
**INSTRUCCIONES DE USO**  
**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**FENTROL** es un insecticida del grupo de los piretroides de última generación que actúa por contacto e ingestión. Se recomienda para el control de plagas en los cultivos indicados en el cuadro de abajo.

Cultivo	Plaga	Dosis	Recomendaciones
Aguacatero (21)	<b>Trips</b> <i>Scirtothrips perseae</i> <i>Frankliniella bruneri</i>	12.5-17.5 mL/100 L agua	Aplicar cuando se encuentre que de cada 10 flores 2 estén infestadas, al menos con un Trip (ninfas o adultos).
	<b>Mosca Blanca</b> <i>Tetraleurodes perseae</i> Nakara	300 mL/1000 L agua	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 14 días.
	<b>Gusano Telarañero</b> <i>Amorbia cunneana</i>	300 mL/1000 L agua	Iniciar las aplicaciones cuando se observen las primeras larvas. Realizar dos aplicaciones a intervalos de 14 días.
Algodonero (21)	<b>Mosquita Blanca</b> <i>Bemisia argentifolii</i>	300-350 mL/Ha	Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos.  De ser necesario, realizar otra aplicación a un intervalo de 7 días.
Maíz Sorgo (1)	<b>Gusano cogollero</b> <i>Spodoptera frugiperda</i>	100-150 mL/Ha	Se recomienda realizar la aplicación en larvas L1 y L2.
Cebolla Ajo (14)	<b>Trips</b> <i>Thrips tabaci</i>	250 mL/Ha	Iniciar con la aplicación cuando se encuentren entre 5 y 10 trips por planta.  En infestaciones mayores de 10 trips por planta, se sugiere realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días.
Brócoli Col Col de Bruselas Coliflor (1)	<b>Gusano falso medidor</b> <i>Trichoplusia ni</i> <b>Gusano soldado</b> <i>Spodoptera exigua</i> <b>Palomilla dorso de diamante</b> <i>Plutella xylostella</i>	200-300 mL/Ha	Aplicar preferentemente sobre estadios iniciales, cuando la inspección indique que se ha alcanzado el umbral de presencia de la plaga.
Jitomate Tomate de cáscara Chile Berenjena (5)	<b>Gusano barrenador del fruto</b> <i>Helicoverpa zea</i>	150 – 200 mL/Ha	Es recomendable aplicar cuando se detecten las primeras larvas iniciando su desarrollo. Normalmente ocurre durante la fructificación.
	<b>Gusano soldado</b> <i>Spodoptera exigua</i>	150 – 200 mL/Ha	Preferentemente aplicar sobre estadios larvales L1 y L2.
	<b>Trips</b> <i>Frankliniella occidentalis</i>	150 – 200 mL/Ha	Aplicar cuando de 10 flores o 10 terminales, 5 estén infestadas por al menos un trip.
Tabaco (SL)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	150 – 200 mL/Ha	Aplicar cuando de 10 flores o 10 terminales, dos estén infestadas por al menos un trip.

**PRECAUCIÓN (azul 293-C)**

**Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:** 24 horas

( ) Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

### **MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO**

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **FENTROL** siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario, adicionar un buferizante. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y sólo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis autorizada de **FENTROL**. Agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Perfore el envase vacío y deposítelo en un Centro de Acopio Autorizado.

El volumen de agua está en función de varios factores, entre los más importantes la etapa fenológica del cultivo, equipo de aplicación, presión y boquilla a utilizar, por esta razón, se recomienda que siempre calibre su equipo de aplicación, a fin de obtener un volumen de agua suficiente que permita cubrir de manera uniforme el follaje del cultivo de acuerdo a su tamaño. Utilice boquillas para la aplicación de insecticidas que le permitan obtener una densidad promedio de 50-70 gotas/cm<sup>2</sup>. En equipos montados al tractor, se recomienda que la velocidad de trabajo sea entre 6-8 km/hora. Si el viento aumenta, reduzca la velocidad de trabajo para disminuir la deriva. Para aplicación en banda, utilizar el número de boquillas necesarias para cubrir el follaje del cultivo. La altura óptima de aspersión para las puntas de pulverización de 80° es de 75 cm y 50 cm para las de 110° y el traslape mínimo entre las boquillas debe ser de un 30%. No obstante la altura del aguillón estará en función de la etapa fenológica del cultivo, por lo que se deberán hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las alturas recomendadas por el fabricante. Las boquillas deberán ser cambiadas cuando su gasto exceda a un 10% con respecto a una nueva.

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

El personal de aplicación debe estar capacitado y recibir capacitaciones periódicas sobre el manejo y uso correcto de plaguicidas.

### **CONTRAINDICACIONES**

- A fin de evitar la deriva o acarreo del producto, realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde y no aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/ h.
- No aplicar cuando la temperatura sea mayor a 30°C.
- No aplicar en presencia de lluvia, o cuando exista posibilidad de la misma.
- No aplicar cuando el cultivo se encuentre en estrés.

### **FITOTOXICIDAD**

**FENTROL** no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**PRECAUCIÓN (azul 293-C)**

### INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **FENTROL** en mezcla de tanque con otros productos agroquímicos. Sin embargo, si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados y autorizados en los cultivos recomendados en esta etiqueta. De manera previa a la aplicación, deberá realizar una prueba de incompatibilidad y fitotoxicidad.

### MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**FENTROL** a base de gamma cyhalotrina pertenece al grupo químico de los piretroides y actúa por contacto e ingestión. La gamma cyhalotrina afecta el equilibrio de los iones de sodio y potasio negativamente, alargando los impulsos en la membrana de las células. Esta influencia afecta la transmisión normal de los impulsos nerviosos causando repetidas descargas en los nervios de los insectos, lo cual resulta en parálisis y por último la muerte del insecto.

No realizar más de dos aplicaciones consecutivas de **FENTROL**, ni más de cuatro por ciclo de cultivo.



PRECAUCIÓN (azul 293-C)

## ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de **FENTROL**:

- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón largo, guantes de nitrilo o neopreno, mascarilla con filtros, lentes de seguridad, gorra y botas de neopreno. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, de manera separada a la ropa de uso común, seque al sol y guárdelos en el lugar de trabajo en un área fresca y bajo llave.
- Deje ventilar el vehículo donde transporta el producto durante 20 minutos previo a la descarga.
- En caso de contacto con la piel, boca, ojos u otra parte del cuerpo, lávese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.
- Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No reutilice este envase.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**

### PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
  2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
- **Si el producto fue ingerido:** Si la persona está **CONSCIENTE**, enjuague inmediatamente la boca. Dele a beber de 1 a 2 vasos de agua. **NO INDUZCA EL VÓMITO.** No administre leche o sustancias que contengan grasas. Si la persona está **INCONSCIENTE** asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
  - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
  - **Si el producto se absorbió por la piel:** Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.

**PRECAUCIÓN (azul 293–C)**

- **Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
  - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

## RECOMENDACIONES AL MÉDICO

### **FENTROL (gamma cyhalotrina) pertenece al grupo químico de los piretroides.**

**Antídoto y tratamiento:** Este producto no tiene antídoto específico, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático y de soporte. En caso de contacto con la piel, tratar con lidocaína o crema con vitamina E. Si hay contacto con los ojos, tratar con anestésico local. La terapia en los niños deberá ser supervisada por un médico. El intoxicado debe mantenerse bajo vigilancia médica por lo menos durante 48 horas evitando la exposición posterior a cualquier plaguicida.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de la ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. **Los síntomas por sobreexposición incluyen:** Puede causar reacciones alérgicas en personas susceptibles. Los insecticidas piretroides afectan el sistema nervioso central. Además, dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: **si se ingiere o inhala,** dolor de cabeza, mareos y disminución de la consciencia; **al contacto con la piel,** sensación de ardor, hormigueo o entumecimiento en las áreas expuestas (parestesia); **al contacto con los ojos,** dolor, moderada irritación.

**En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.**

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

**PRECAUCIÓN (azul 293-C)**

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

#### **GARANTÍA**

**FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **FENTROL** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



**PRECAUCIÓN (azul 293-C)**